

# CREATIVE FIX SOLID

## Flowering and Fruit Setting inducer

- BIOREGULATOR
- INCREASES FLOWERING, FRUIT SET AND FATTENING OF FRUITS
- INCREASES YIELD

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Phosphorous (P2O5):..... | 9,5  |
| Molybdenum (Mo):.....    | 10   |
| Boron (B):.....          | 8    |
| Potassium (K2O):.....    | 12,6 |
| Aminoacids:.....         | 5    |



250gm

**CFP**  
المبيدعون  
للأسمدة  
والمبيدات



Produced By :  
CREATIVES  
FOR FERTILIZERS  
AND PESTICIDE  
info@cfpjo.com

## محفز مجموعة الإزهار والفواكه

### الخصائص:

سماد باوذر عالي التركيز يحتوي على الموليبدنيوم والبورون. مدعم بالفوسفور القابل للذوبان. يتميز بتأثير تآزري، ويحفز الإزهار وعقد الثمار، مما يحسن نموها. كما يعالج نقص العناصر الغذائية، ويجنب المشاكل الصحية، ويحسن إنتاجية المحاصيل. يعدّ كل من البورون والموليبدنيوم ضروريين للمحاصيل متعددة الإزهار القسرية، حيث تتداخل مرحلتا عقد الثمار والنمو..

### الفوائد:

يقلل من تساقط براعم الأزهار وتساقط الثمار في بداية عقدتها. يعزز نمو الثمار وتسمينها. يحفز الإزهار. يحسن جودة حبوب اللقاح. يحفز عقد الثمار.

### التطبيق (الرش الورقي)

- يستخدم بمعدل (350-450) مل لكل (200) لتر ماء لكل (1000) متر مربع.  
- التكرار: يرش من (3) إلى (4) مرات خلال الموسم من بداية العقد بفواصل زمني 15 يوم، حسب الحاجة ونمو النبات.

**الضمان :** تضمن الشركة المنتج في عبواته الأصلية تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 60 شهر من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الإستخدام أو التخزين

### التحذيرات والاحتياطات :

- اتركه بعيدا عن متناول الأطفال .  
- تجنب الكل والشرب والتخزين أثناء استخدام المنتج.  
- اربداء الثياب والقفازات والنظارات الواقية أثناء الاستخدام والتداول

**الحفظ والتخزين :** يجب أن يتم تخزينها في منطقة جيدة وجافة. ودرجة حرارة التخزين المثلى بين 5 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.

### Actions:

REDUCES THE ABSCISSION OF FLOWER BUDS AND FRUIT DROP AT THE BEGINNING OF FRUIT SET.

FAVORS THE DEVELOPMENT, GROWTH AND FATTENING OF FRUITS.

INDUCES FLOWERING .

INCREASES POLLEN QUALITY .

STIMULATES THE FRUIT SETTING.

| الري بالتنقيط<br>Drip irrigation | الرش الورقي<br>Foliar application | المحصول<br>Crops                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2م / 1000 غرام                   | 20-30 غم/ 200 لتر ماء             | الخضراوات<br>Vegetables                              |
| 2م / 1000 غرام                   | 20-30 غم/ 200 لتر ماء             | نباتات الزينة<br>Ornamental                          |
| 2م / 1000 غرام                   | 20-30 غم/ 200 لتر ماء             | اشجار الفاكهه والحمضيات<br>Citric trees, fruit trees |

### Application (foliar spray)

Foliar application: It is applied to stimulate fruit knots and growth, before flowering, petal fall, end of knots and growth.

Drip irrigation: Irrigation from the beginning of flowering until the end of the decade.